PUSH MED SHOULDER BRACE PLUS

INTRODUCTION

Push med products provide effective solutions for the treatment and prevention of injuries of the locomotor apparatus.

Your new shoulder brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push med shoulder brace Plus ensures proper fixation and pain relief. Mechanical support and stable shoulder positioning constitute the basis of its performance.

Push med products are innovative and are manufactured for you with great care. We are committed to providing you maximum confidence in the interest of user satisfaction. Read the product information carefully before you use the Push med shoulder brace Plus. If you have any questions, do not hesitate to ask your supplier or use www.push.eu (info@push.eu).

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push med shoulder brace Plus consists of four components. The breast strap, which is closed around the chest or upper waist, constitutes the basis of the brace. This strap only needs to be adjusted once for the correct size. The 'quick lock' (◯) can be used to open and close the breast strap and to adjust it for maximum comfort. The upper arm strap fixes the upper arm against the body to prevent abduction of the shoulder as much as possible. The comfortable wristhand support keeps the arm in place and supports it. The added shoulder strap adds comfort to the Push med shoulder brace Plus: this strap provides additional immobilisation and support to the affected shoulder joint and allows the hand to be kept at the desired height. Each fixation point is individually adjustable, for an optimal fit in all circumstances. The brace is made of Sympress™, a comfortable and high-quality material. The microfibre used makes the inside soft to the touch and keeps the skin dry. The edges of the straps also feel soft. The Push med shoulder brace Plus can be washed normally.

INDICATIONS

- Collarbone fracture
- Treatment after (subluxation
- Treatment after (subluxation of the SC or AC joint
- Postsurgical treatment
- Humeroscapular periarthritis
- Subcapital humerous fracture
- As a sling in the case of a flaccid hemiparesis (delp at right)

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too tightly at first.

Pain is always a warning sign. If the pain persists or symptoms worsen, it is advisable to consult your doctor or therapist.

FITTING / SETTING

The shoulder brace is available in 3 sizes. For proper fitting, the chest circumference is measured 5 centimetres above the elbow, with your arm hanging relaxed by your side. The table on the packaging shows the correct brace size for your chest circumference.

Use the molecule symbols featured on the hook and loop fasteners as your guide to determine the correct fitting sequence (◯ ◯ ◯).

All hook and loop fasteners marked with symbols must be opened; the others remain closed.

A. Grasp the brace with the nonaffected arm at the wide section of the shoulder strap.

B. Put the affected arm and your head through the opening.

C. Close the upper arm strap by passing the strap through the clasp and closing it just above the elbow (◯).

For the professional who supplies the brace: Before initial use, two straps of the brace must be adjusted for the patient once:

D.1 Adjust the shoulder strap at the back to ensure that the breast strap is a the same height as the upper arm

D.2. Then adjust the breast strap so that it fits snugly to the body and feels comfortable for the patient.

D. Close the breast strap so that it fits comfortably (◯).

E. Put your hand in the wristhand support and close it on the shoulder strap (◯).

F. You may slide the wristhand support on the breast strap (left/right) or pull it (up/down), to achieve the best possible fit.

Fixing instructions for patients in a reclining position:

- Measure half of the circumference of the patient
- Multiply this by 2
- Use the clasp to adjust the length of the breast strap at the back
- Open the breast strap using the quick release
- Fit the brace

CARE AND MAINTENANCE

To promote hygiene and to maximise the lifespan of the brace, it is important to wash the brace regularly, following the washing instructions.

If you intend not to use the brace for some time, it is recommended that you wash and dry the brace before storage.

Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30 °C, on a delicate fabric cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used; after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist.
- Push braces were designed be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Try on the brace before purchasing to check its size. Your retailer's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to consult it for fitting instructions whenever needed.
- Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace before each use for signs of wear or ageing of components or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- In accordance with EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the appropriate regulatory body in the user's country of residence.
- It is advisable in the case of possible skin irritation to wear the brace over one's clothes.

Push® is a registered trademark of Nea International bv

Nea International bv
Europlaan 31
6199 AB Maastricht-Airport
The Netherlands
www.push.eu
Designed in the Netherlands
Made in the EU
© Nea
Medical Device
01 / 2022
1 20394-20 3 / 3
REF 2.50.2

MED

SHOULDER BRACE PLUS

PRODUCT INFORMATION

push braces

EN • AR • KRN • SL
EL • YKP • CHN • FR • RO
• LT • LV • TR •

دعامة الكتف بلس من PUSH MED

مقدمة

توفر منتجات Push med حلولا فعالة من أجل العلاج والوقاية لإصابات الجهاز الحركي.

تتميز دعامة الكتف الجديدة هي إحدى منتجات Push med مصنوع على من الفاعلية والراحة والجودة. توفر لك دعامة الكتف بلس من Push med التثبيت المناسب، كما تعمل على تسكين الألم. يشكل الدعم الميكانيكي والاحتفاظ بالوضع الصحيح أساس أدائها.

تتميز منتجات Push med بالابتكار، وقد صُنعت خصيصا من أجلك بعناية فائقة. نحن ملتزمون بتوفير أقصى قدر من الثقة والحرص على مصلحة المستخدمين. لا تتردد في قراءة معلومات المنتج بعناية قبل استخدام دعامة الكتف بلس من Push med. إذا ورد لك أي سؤال فلا تتردد بسؤال المورد أو استخدام www.push.eu (info@push.eu).

مميزات المنتج

تتكون دعامة الكتف بلس Push med من ثلاثة أجزاء. يُشكل حزام الصدر أساس هذه الدعامة، والذي حول الصدر أو أعلى الخصر. يمكن ضبط هذا الحزام مرة واحدة فقط للحصول على المقاس الصحيح. يمكن استخدام القفل السريع (◯) لغلق وفتح حزام الصدر وتعديله من أجل حصولك على الراحة القصوى. يثبت حزام الذراع العلوي على تثبيت مفصل الجسم لمنع تباعد الكتف بقدر الإمكان. يحافظ دعم المعصم والقبو الجريح على تثبيت الذراع ودعمه. تضمن لك دعامة الكتف بلس Push med الراحة من خلال إضافة حزام الكتف إلى الدعامة: حيث يوفر الحزام تثبيتا إضافيا ودعما لمفصل الكتف المصاب ويسمح لإبقاء اليد في الارتفاع المطلوب. يمكن تعديل كل نقطة تثبيت على حدة من أجل ملاءمة مثالية في كل الظروف. صُنعت هذه الدعامة من مادة Sympress™، وهي مادة مريحة وعالية الجودة. تستخدم الألياف مجهرية؛ مما تمنحك الشعور بنعومة الملمس في الداخل، وتحافظ على دفاف الجلد. تشعر أيضا بنعومة الأشرطة بنعومة الملمس. يمكن غسل دعامة الكتف Push med بشكل عادي.

دواعي الاستعمال: تستخدم في الحالات الآتية

- كسر عظام الترقوة
- العلاج بعد الخلع الجزئي
- العلاج بعد الخلع الجزئي للمفصل القصي الترقوي والمفصل الأكرومي الترقوي
- العلاج بعد العمليات الجراحية
- التهاب حول المفصل الكتفي
- كسر تحت رأس عظمة العضد
- كما تستخدم الدعامة كحمالة في حالة الخزل الشقي المنحبط (الشلل النصفي) وأيضا عند الثبل
- لا توجد اختلالات معروفة لا تتمكن معها من ارتداء الدعامة. قد تسبب الدعامة فرط الدم في حالة ضعف الدورة الدموية في الأطراف. إغلاق الدعامة بإحكام شديد في البداية
يجد الألم عادة إشارة على التحذير. إستحسن استشارة الطبيب أو المعالج إذا استمر الألم أو تدهورت الشكوى.

ملاءمة الفيلكرو/التضبيط

تتوافر دعامة الكتف في ثلاثة مقاسات. تضمن القياس الصحيح: قس محيط الصدر فوق مستوى المرفق المعلق بخمسة سنتيمترات. يعرض الجدول في الغلاف قياس الدعامة الصحيح المناسب لمحيط صدرك.

يُحدد تسلسل القياس الصحيح بواسطة حساب الزيادة في رموز الجزيء، على شرائط الفيلكرو (المطفيلف، والمفلقن) (◯ ◯ ◯).

جميع شرائط الفيلكرو المعلمة بالرموز يجب فتحها؛ بينما تبقى الأدوات الأخرى مغلقة.

A. امسك الدعامة بذراعك غير المصابة عند الجزء العريض من حزام الكتف.

B. ضع ذراعك المصابة ورأسك خلال الفتحة.

C. أغلق حزام الذراع العلوي بتمرير الحزام خلال المشبك ثم قفله بالضبط فوق المرفق (◯).

إلى الشخص المحترف الذي يجهز الدعامة: يجب ضبط شريطي الدعامة للمريض مرة واحدة في البداية:

D.1 اضبط حزام الكتف من الخلف لضمان تساوي ارتفاع حزام الثدي مع الذراع العلوي

D.2 ثم اضبط حزام الثدي بحيث يتطابق وتحكم على الجسم بشكل مريح للمريض.

D. أغلق حزام الثدي حتى يلتصق بشكل مريح (◯).

E. ضع يدك في دعم المعصم وأغلقه على حزام الكتف (◯).

F. يمكنك تحريك تثبيت المعصم ودعم اليد على حزام الصدر إلى اليسار أو إلى اليمين أو سحبه لأعلى أو لأسفل؛ لتحقيق أفضل وضع ممكن.

إرشادات التثبيت للمرضى في وضع استلقائي:

- قس نصف المحيط للمريض
- ضاعف هذا الرقم في 2
- استخدم المشبك لضبط طول حزام الثدي من الخلف
- افتح حزام الصدر باستخدام ثقابة التحرير السريع
- أزرع الدعامة

العناية والصيانة

لزيادة النظافة الشخصية وللإطالة مدة خدمة الدعامة: من المهم غسل الدعامة باتقطام واتباع تعليمات غسلها.

إذا كنت تنوي عدم استخدام الدعامة لبعض الوقت، فوصيك بغسل الدعامة وتجفيفها قبل تخزينها.

قبل الغسل أغلق شرائط الفيلكرو (المطفيلف والمفلقن)؛ لحماية الدعامة والغسيل الآخر.

يمكن غسل الدعامة عند درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية في دورة أقمشة رقيقة أو باليد. تجنب استخدام أي عوامل مبيضة للملابس.

يمكن استخدام دورة لطيفة سريعة الدوران وجافة. ثم علق الدعامة حتى تجف في الهواء الطلق (ليس بالقرب من مصدر ساخن أو مجفف الملابس).

معلومات هامة

- قد يتطلب الاستخدام الصحيح لدعامة Push تشخيصا من قبل الطبيب أو المعالج.
- صممت دعامات Push لارتدائها على البشرة السليمة غير الصحية. ويتبغي تغطية البشرة المصابة بمادة مناسبة قبل ارتدائها.
- يمكن تحقيق الأداء الأمثل للدعامة فقط بإختيار المقاس الصحيح. ارتدِ الدعامة قبل شرائها لتتأكد من المقاس المناسب. سيشرح لك الموظف المختص لدى البائع الفصل طريقة لاستخدام وتركيب دعامة Push. نوصيك بالاحتفاظ بمعلومات هذا المنتج في مكان آمن؛ حتى تتمكن من الإطلاع عليه في أي وقت لرؤية التثبيت الصحيح.
- استشر مختصا إذا تطلبت الدعامة مواصمة فردية.
- تحقق من دعامة Push قبل كل استخدام؛ خشية حدوث علامات تآكل أو تقادم للأجزاء والخامات. لا يمكن ضمان الأداء الأمثل لدعامة Push إلا في حالة سلامة المنتج تماما.
- ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي 647/2017 بشأن الأجهزة الطبية، يتعين على المستخدم الإبلاغ عن أي حوادث خطيرة تتعلق بالمنتج إلى الشركة المصنعة، وكذلك إلى السلطات المعنية في الدولة المحترم في الاتحاد والمقيم فيها المستخدم.
- يُصح بإرتداء الدعامة فوق ملابسك في حالة تهيجات الجلد المحتملة.

Push® is a registered trademark of Nea International bv

Push® ان هي علامة تجارية مسجلة لشركة Nea International bv

PUSH MED 어깨보호대 PLUS

소개

Push med 제품은 근육골격계의 부상을 치료하고 예방하는 효과적인 솔루션입니다.

효과가 좋으며, 편안한 사용법, 고품질이 특징인 Push med 제품의 새로운 어깨보호대입니다. Push med 어깨보호대 Plus는 적절한 고정력을 제공하고 통증을 완화합니다. 기계적인 지지력과 안정적인 어깨 자세를 유지하여 최적의 성능을 제공합니다.

혁신적인 Push med 제품은 최상의 보조 기능을 발휘합니다. 당신는 사용자에게 최상의 만족을 제공하기 위해 노력합니다. Push med 어깨보호대 Plus를 사용하기 전에 제품 정보를 주의해서 읽어 보세요. 궁금한 점이 있으시면 연락처에 문의하거나 www.push.eu (info@push.eu)로 이메일을 보내세요.

제품 특성

Push med 어깨보호대 Plus는 4가지 요소로 구성되어 있습니다. 가슴 고정끈는 흉부 또는 허리 상부를 둘러싸는 형태로 제작됩니다. 이 고정끈는 정확한 사이즈로 한 번만 조정하면 됩니다. '퀵록' (◯)을 통해 가슴 고정끈를 고정하고 풀어서 최대한 편안하게 조정할 수 있습니다. 상박 고정끈는 어깨 외전을 최대한 예방하기 위해 신체에 상박을 고정합니다. 편안한 손목은 팔을 지지하는 동시 고정하고 지지합니다. Push med 어깨보호대 Plus는 보호대에 부착된 어깨 고정끈를 통해 편안함을 추가합니다. 이 고정끈는 추가적인 고정력을 제공하여 아픈 어깨 관절을 지지하고 원하는 높이로 손을 유지합니다. 모든 상황에서 최적의 보조 고정하기 위해 각 고정 포인트를 개별적으로 조정할 수 있습니다. 보호대는 편안한 고품질 소재 Sympress™으로 제조되었습니다. 극세사 소재는 부드러운 내부 촉감을 제공하고 피부를 건조하게 유지합니다. 고정끈 가장자리가 부드럽게 느껴집니다. Push med 어깨보호대 Plus는 일반 세탁이 가능합니다.

적응증

- 쇄골 골절
- 어깨구 후 치료
- 흉쇄 관절 또는 견봉쇄골 관절의 아탈구 후 치료
- 수술 후 치료
- 상완골 -견갑골 관절주위염
- 골두하 상완골 골절
- 반신불완전마비의 슬링으로 사용(아간 사용)

보호대를 착용할 수 없거나 착용하면 안되는 것으로 알려진 장애는 없습니다. 사지에 도는 혈액 순환이 좋지 않을 경우, 보호대는 충혈증을 유발할 수 있습니다. 보호대를 처음 착용시 너무 꽉 끼지 않도록 하십시오.

통증은 항상 경고를 주의하여야 합니다. 통증이 지속되거나 악화되면, 주치의나 물리치료사에게 문의하세요.

피팅 / 사이즈

보호대는 3가지 사이즈가 있습니다. 적절한 피팅을 위해 고정하는 팔꿈치 위 5 cm 에서 가슴 둘레를 측정하세요. 포장지 표의 가슴 둘레에 따라 정확한 보호대 사이즈를 선택하십시오.

올바른 피팅은 후크 및 고정장치에 적혀있는 숫자의 순서대로 진행하면 됩니다 (◯ ◯ ◯).

기호가 표시된 모든 후크와 루프 패스너는 풀고 다른 것은 잠금 상태로 둡니다.

A. 어깨 고정장치의 넓은 부위를 통해 반대쪽 손으로 보호대를 집습니다.

B. 어리는 팔을 보호대를 다친 어깨에 끼웁니다.

C. 상완골 고정끈를 통과시키고 팔꿈치 바로 위에 고정하여 상부 고정끈를 고정합니다 (◯).

보호대를 공급하는 전문가용: 2개의 보호대 고정끈는 최초 사용 전에 환자에 대해 한 번 조정해야 합니다.

D1. 어깨에 어깨 고정끈를 조정하여 가슴 고정끈가 상박과 같은 높이가 되도록 하십시오.

D2. 가슴 고정끈를 조정하여 신체에 알맞게 붙고 환자가 편하게 느껴지 합니다.

D. 편하게 느끼도록 가슴 고정끈를 고정합니다(◯).

E. 손목는 지지대에 손을 넣고 어깨 고정끈에 고정합니다(◯).

F. 손목는 지지대를 가슴 고정끈 좌우로 움직이거나 상하로 당겨서 가장 좋은 위치를 얻을 수 있습니다.

등로 기댄 환자에 대한 고정 방법:

- 환자 가슴 둘레의 절반을 측정합니다.
- 2배로 곱합니다.
- 걸쇠를 이용하여 뒤에서 가슴 고정끈의 길이를 조정합니다.
- 퀵 릴리스를 통해 가슴 고정끈를 풉니다.
- 보호대를 착용합니다.

유지 및 관리

위생을 개선하고 보호대의 수명을 최대화하기 위해 세탁 지침에 따라 보호대를 정기적으로 세탁해야 합니다.

한 동안 보호대를 사용하지 않으려면 보관하기 전에 보호대를 세척하고 건조하는 것이 좋습니다.

세탁하기 전에 후크와 루프 패스너를 잠궈 보호대와 세탁물을 보호하세요.

최대 30°C의 온도에서 섬세한 직물 모드 또는 손으로 보호대를 세탁할 수 있습니다.

표백제를 사용하지 마십시오.

부드러운 회전 탈수기를 이용할 수 있습니다. 보호대를 욕외에서 건조하십시오(드라이기 또는 드럼 건조기를 사용하지 **마십시오**).

중요 사항

- Push 보호대를 적합하게 사용하기 위해 의사 또는 물리치료사의 진단이 필요할 수 있습니다.
- Push 보호대는 부상을 입지 않은 피부에 착용하도록 고안되었습니다. 부상을 입은 피부는 우선 적절한 재료 덮어야 합니다.
- 정확한 사이즈를 선택할 때 최적의 기능을 발휘할 수 있습니다. 구입하기 전에 보호대를 착용하여 정당한 크기인지 확인하십시오. 제품매장에의 전문 직원이 Push 보호대를 착용하는 방법을 설명해 드릴 것입니다. 필요할 때 쉬운 지침을 보기 위해 본 제품 설명서를 안전한 장소에 보관하십시오.
- 제품의 개별 조정이 필요하면 보호대 전문가에게 문의하십시오.
- Push 보호대를 사용하기 전에 마모되거나 낡은 부품이나 연결부위가 있는지 확인하십시오. Push 보호대가 온전한 상태일 때에만 최적의 성능이 보장됩니다.
- 의료 장치에 대한 EU 규정 2017/745에 따라, 사용자는 제품과 관련된 중대한 사고를 제조업체 및 사용자가 거주하는 회원국의 관할 당국에 보고해야 합니다.
- 피부 자극이 있을 경우 옷에 보호대를 착용하는 것이 좋습니다.

Push®는 Nea International bv의 등록 상표입니다.

PUSH MED ORTÉZA RAMENA PLUS

ÚVOD

Výrobky Push med predstavujú účinné riešenie pri liečbe a prevencii úrazov pohybového ústrojenstva.

Vaša nová ortéza ramena je výrobkom línie Push med, ktorej charakteristikou je vysoká efektívnosť, pohodlnosť a kvalita. Push med ortéza ramena Plus zaisťuje správnu fixáciu a úľavu od bolestí. Základnou charakteristikou je mechanická podpora a stabilizácia pozície ramena.

Výrobky Push med sú charakteristické svojou pokrokovosťou a ich výrobe je venovaná najvyššia starostlivosť. Tieto atribúty zaisťujú ich maximálnu bezpečnosť a väčšiu voľnosť pohybu. Ciefom je zabezpečiť Co najvačšie uspokojenie z ich noseniа. Pred použitím Push med ortézy ramena Plus si dobre preštudujte tieto informácie o výrobku. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obráťte sa, prosím, na svojho predajcu. Prípadne nám svoje otázky pošlite e-mailom na adresu info@push.eu.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Push med ortéza ramena Plus pozostáva zo 4 súčastí. Základnou ortézy je hrudný pás, ktorý sa obopína okolo spodnej časti hrudníka alebo vrchnej časti pásu. Tento pás sa upravuje iba raz pri nastavení správnej veľkosti. Hrudný pás môžete uvoľniť a zapnúť pomocou „rýchleho zámku" (◯), ktorým teď môžete upraviť jeho nastavenie pre maximálne pohodlie. Upaženu bráni v najvačšej možnej miere ramenný pás, ktorý fixuje končatinu k telu. Pohodlná podpora zápästia/ruky zaisťuje fixáciu a podporu ramena. Push med ortéza ramena Plus zvyšuje komfort pomocou dodatočného pásu okolo pleca: tento pás zaisťuje dodatočné znehybnenie a podporu poškodeného ramenného kĺbu a udržuje ruku v požadovanej výške. Každý fixačný bod sa nastavuje zvlášť, čím je zaistené optimálne prispôsobenie sa za každých podmienok. Ortéza je vyrobená z vysoko kvalitného a pohodlného materiálu Sympress™. Vďaka použitým mikrovláknam je materiál zvnútra mäkký na dotyk a udržuje pokožku suchú. Okraje závesov sú tiež mäkké na dotyk. Push med ortéza ramena Plus sa dá bez problémov prať.

INDIKÁCIE

- Zlomenina kľúčnej kosti
- Liečba po (sub) luxácii
- Liečba po (sub) luxácii sternoklavikulárneho alebo akromioklavikulárneho kĺbu
- Pooperačná liečba
- Humeroskapulárna periartritída
- Proximálna zlomenina humeru
- Ako záves v prípade slabej hemiparézy (aj v noci)

Nie je známa žiadna porucha, pri ktorej by sa ortéza nedala alebo nesmela nosiť. Pri zlom prekrvovaní končatín môže ortéza spôsobovať hyperémiu (prekrvenie).

Zo začiatku dávajte pozor, aby ste ortézu príliš neufahovali.

Bolesť je vždy varovným znamením. Pokiaľ bolesť pretrváva alebo sa ťažkosti zhoršujú, je vhodné poradiť sa s lekárom alebo terapeutom.

VÝBER SPRÁVNEJ VEĽKOSTI/NASADENIE

Ortéza ramena sa vyrába v 3 veľkostiach. Na výber správnej veľkosti je potrebné odmerať obvod hrudníka 5 centimetrov nad úrovňou lakťa pri voľne zvesenej končatine. V tabuľke na obale je uvedená správna veľkosť ortézy pre daný obvod hrudníka.

Správne postup pri nasadzovaní ukazujú narastajúce symboly molekúl na suchých zipsoch (◯ ◯ ◯).

Všetky pásy so suchým zipsom, ktoré sú označené symbolom je potrebné rozopnúť, ostatné ostávajú zapnuté.

A. Uchopte ortézu zdravou rukou na širokej strane pásu pre plece.

B. Prestrčte otvorom poškodenú končatinu a hlavu.

C. Zapnite pás nad laktom tak, že ho prestrčíte sponou a zapnete tesne nad laktom (◯).

Informácie pre odborníka, ktorý ortézu poskytuje: Pred prvým použitím je potrebné pacientovi nastaviť nastavia dva pásy:

D1. Nastavte ramenný pás na chrbte tak, aby hrudný pás v rovnakej výške ako horná časť ramena.

D2. Potom nastavte hrudný pás tak, aby tesne priliehal k telu a bol pacientovi pohodlný.

D. Zapnite hrudný pás tak, aby vám pohodlne sedel (◯).

E. Vložte ruku do podpory zápästia/ruky, ktorú potom pripnete k pásu, ktorý ide okolo pleca (◯).

F. Podporu zápästia/ruky je možné posúvať na hrudnom páse hore/dole alebo dolava/doprava a dosiahnuť tak, čo najlepšiu polohu.

Fixačné pokyny pre pacienta v polohe ležmo:

- Odmerajte polovicu obvodu pacienta.
- Vynásobte ju číslom 2.
- Na upravenie dĺžky hrudníka pásu použite sponu umiestnenú na chrbte.
- Otvorte hrudný pás pomocou rýchleho zámku.
- Prispôsobte ortézu.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

V záujme hygieny a maximálneho predĺženia životnosti bandáže je dôležité bandáž pravidelne prať, prísom postupuje v súlade s pokynmi na pranie.

Ak zamýšľate nejaký čas bandáž nepoužívať, odporúčame, aby ste ju pred odložením vyprali a vysušili.

Pred praním na ochranu ortézy a ostatnej bielizne uzavrite suchý zips.

Ortéza sa môže prať pri teplote do 30 °C v režime jemných tkanín alebo v rukách. Nepoužívajte bieliace prípravky.

Možno použiť jemné odstredenie. Potom nechajte ortézu voľne uschnúť na vzduchu (**nie** v blízkosti tepelného zdroja; resultte pomocou sušičky).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

- Na správne použitie ortézy Push je vhodné stanovenie diagnózy lekárom alebo terapeutom.
- Bandáže Push boli navrhnuté na nosenie na nepoškodenej pokožke. Poškodenú pokožku najprv prekryte vhodným materiálom.
- Optimálne fungovanie môžete dosiahnuť len pri výbere správnej veľkosti. Pred kúpou si bandáž nasaďte a skontrolujte jej veľkosť. Odborný personál predajcu vám vysvetlí najlepší spôsob, ako si bandáž Push nasadiť. Odporúčame vám, aby ste uchovali tieto informácie o výrobku na bezpečnom mieste. Môžete si tak kedykoľvek pozrieť pokyny na nasadzovanie bandáže.
- Ak si výrobok prispôsobiť individuálne prispôsobenie, obráťte sa na odborníka na bandáže.
- Ortézu Push si pred každým nasadením najskôr skontrolujte, aby ste včas postrehli prípadné známky opotrebenia alebo starnutia súčastí alebo šitia. Optimálnu funkciu ortézy Push možno zaručiť len vtedy, ak je výrobok nepoškodený.
- V zmysle nariadenia EÚ 2017/745 o zdravotníckych pomôckach musí používateľ výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ bydlisko, nahlásiť všetky závažné nehody súvisiace s týmto výrobkom.
- V prípade možného podráždenia kože sa odporúča ortézu nosiť na obličení.

Push® je registrovaná známka spoločnosti Nea International bv

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΩΜΟΥ PUSH MED PLUS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα προϊόντα Push med παρέχουν αποτελεσματικές λύσεις για τη θεραπεία και την πρόληψη τραυματισμών στο κινητικό σύστημα.

Ο νάρθηκας ώμου νάρθηκας ώμου είναι προϊόν Push med και προφέρει αποτελεσματικότητα, άνεση και άριστη ποιότητα. Ο νάρθηκας ώμου Push med Plus εξασφαλίζει ορθή στερέωση και ανακούφιση από τον πόνο. Η μηχανική υποστήριξη και η σταθερή θέση του ώμου αποτελούν τη βάση της απόδοσής του.

Το προϊόντα Push med είναι καινοτόμα και κατασκευάζονται για εσάς με εξαιρετική φροντίδα. Δεσμευόμαστε να συνεπαιδοιεύσουμε τη μέγιστη εμπιστοσύνη που μας δίγκουν οι καινοτομημένοι πελάτες μας. Διάβαστε προσεκτικά τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση του νάρθηκα ώμου Push med Plus. Εάν έχετε ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση www.push.eu (info@push.eu).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο νάρθηκας ώμου Push med Plus αποτελείται από τέσσερα εξαρτήματα. Ο ιμάντας στήθους ο οποίος κλείνει στον θώρακα ή στο άνω μέρος της μέσης αποτελεί τη βάση του νάρθηκα. Αυτός ο ιμάντας χρειάζεται να ρυθμιστεί μόνο μία φορά στο σωστό μέγεθος. Το κυρήγγαρο κλεβώμπαν (◯) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα, το κλείσιμο και τη ρύθμιση του ιμάντα στήθους για μέγιστη άνεση. Για τη μεγαλύτερη δυνατή πρόληψη της απαγωγής του ώμου, ο ιμάντας του ανω βραχίονα στερεώνει τον ανω βραχίονα πάνω στο σώμα. Το άνετο στήριγμα καρπού/χεριού κρατά σταθερό τον βραχίονα και τον στηρίζει. Ο νάρθηκας ώμου Push med Plus είναι πιο άνετος χάρη στον πρόσθετο ιμάντα ώμου: αυτός ο ιμάντας παρέχει επιπλέον ακινητοποίηση και στήριξη στην πληγείσα άρθρωση του ώμου και επιτρέπει τη διατήρηση του χεριού στο επιθυμητό ύψος. Κάθε σημείο στερέωσης ρυθμίζεται ξεχωριστά για βέλτιστη εφαρμογή σε όλες τις συνθήκες. Ο νάρθηκας είναι κατασκευασμένος από Sympress™, ένα υφαντής πολύτιμο υλικό υψηλής ποιότητας. Οι μικρίνες που χρησιμοποιούνται κάθεστικόν το εσωτερικά μαλακά στην αφή και διατηρούν το δέρμα στεγνό. Οι άκρες του ιμάντα είναι επίσης μαλακές. Ο νάρθηκας ώμου Push med Plus μπορεί να πλυθεί κανονικά.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Κάταγμα της κλειδός
- Θεραπεία για εξάρθρημα/υπεξάρθρημα
- Θεραπεία για εξάρθρημα/υπεξάρθρημα της στερνοκλειδικής ή ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
- Μετεγχειρητική θεραπεία
- Περιαρθρίτιδα του ώμου
- Υποκεφαλικό κάταγμα βραχιονίου
- Ως φάκελλος στηρίξης σε περίπτωση αδυναμίας λόγω ημιπαρεσης (και κατά τη διάρκεια της νύχτας)

Δεν υπάρχουν γνωστές διαταραχές εξάτιας των οποίων δεν μπορεί ή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται νάρθηκας. Σε περίπτωση κακής κυκλοφορίας του άμματος στο άκρο, η χρήση νάρθηκα μπορεί να προκαλέσει υπερεμία. Αποφύγετε να δέσετε τον νάρθηκα υπερβολικά σφιχτά στην αρχή.

Ο πόνος είναι πάντα ένδειξη προσοβοπίσης. Εάν ο πόνος παραμένει ή η ενχλήχηση επιδεινώνεται, συνιστάται να συμβουλευτείτε τον ιατρό ή τον θεραπευτή σας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΡΥΘΜΙΣΗ

Ο νάρθηκας ώμου διατίθεται σε 3 μεγέθη. Για σωστή τοποθέτηση, η περίμετρος του θώρακα μετράται 5 εκατοστά πάνω από το ώμος του αγκώνα σε ευθεία θέση. Ο πίνακας της συσκευασίας δείχνει το σωστό μέγεθος νάρθηκα για την περίμετρο του θώρακα σας.

Η σωστή σειρά τοποθέτησης καθοχίζεται από την αυξανόμενη σημανση μορίων στα δεσίματα από άγκιστρα και θηλές (◯ ◯ ◯).

Όλα τα δεσίματα από άγκιστρα και θηλές που φέρουν σύμβολα πρέπει να είναι ανοικτά, ενώ τα άλλα παραμένουν κλειστά.

A. Πιάστε τον νάρθηκα με τον υγιή βραχίονα από το φαρδύ τμήμα του ιμάντα ώμου.

B. Περάστε σπονιστο βραχίονα και το κεφάλι σας μέσα από το άνοιγμα.

C. Κλείστε τον ιμάντα του ανω βραχίονα περνώντας τον μέσα από το κούμπωμα και κουμπώστε τον ακριβώς πάνω από τον αγκώνα (◯).

Για τον επαγγελματία που παρέχει τον νάρθηκα: Πριν από την αρχική χρήση, απαιτείται η ρύθμιση ρυθμιστή των δύο ιμάντων του νάρθηκα για τον ασθενή:

D.1 Ρυθμίστε τον ιμάντα ώμου στην πλάτη για να βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας στήθους βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τον ανω βραχίονα

D.2 Στη συνέχεια, ρυθμίστε τον ιμάντα στήθους ώστε να εφαρμόζει κοντά στο σώμα και να είναι άνετος για τον ασθενή.

D. Κλείστε τον ιμάντα στήθους ώστε να έχει άνετη εφαρμογή (◯).

E. Τοποθέτηστε το χέρι σας στο στήριγμα καρπού/χεριού και κουμπώστε το στον ιμάντα ώμου (◯).

F. Μπορείτε να τοποθετήσετε το στήριγμα καρπού/χεριού στον ιμάντα στήθους (αριστερά/ δεξιά) ή να το τραβήξετε (επάνω/κάτω) για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή.

Οδηγίες τοποθέτησης για ασθενείς σε θέση ανάκλισης:

- Υπολογίστε το ήμισυ της περιμέτρου θώρακα του ασθενούς
- Πολλαπλασιάστε το με το 2
- Χρησιμοποιήστε το κούμπωμα για να ρυθμιστεί το ύψος του ιμάντα στήθους στην πλάτη
- Ανοίξτε τον ιμάντα στήθους χρησιμοποιώντας τη γρήγορη απελευθέρωση
- Τοποθέτηστε τον νάρθηκα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για την προώθηση της υγιεινής και τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του νάρθηκα, είναι σημαντικό να πλένετε τα σταχίγματα τακτικά, ακολουθώντας τις οδηγίες πλύσης.

Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον νάρθηκα για κάποιο διάστημα, συνιστάται να πλύνετε και να στεγνώσετε τον νάρθηκα πριν από την αποθήκευσή του.

Πριν από το πλύσιμο, κλείστε τα δεσίματα από άγκιστρα και θηλές για να προστατέψετε τον νάρθηκα και τα άλλα ρούχα.

Ο νάρθηκας μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασίες έως και 30 °C, σε πρόγραμμα για ευαίσθητα υφάσματα ή στο χέρι. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικούς παράγοντες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ήπιο πρόγραμμα πλύσης; έπειτα, απλώστε τον νάρθηκα για να στεγνώσει φυσικά (**όχι** κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε στεγνωτήριο).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Για την ορθή χρήση του νάρθηκα Push ενδέχεται να απαιτείται διάγνωση από ιατρό ή θεραπευτή.
- Οι νάρθηκες Push έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογή σε δέρμα χωρίς βλάβες. Αν το δέρμα

УКРАЇНСЬКА УКРАЇНСЬКА 中文 FRANÇAIS ROMÂNĂ LIETUVIŲ LATVIEŠU TÜRKÇE WWW.PUSH.EU

ОРТЕЗ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ
PUSH MED SHOULDER BRACE PLUS
АРТИКУЛ 2.50.2

ВСТУП
Ортези серії Med торговельної марки Push є оптимальним рішенням для лікування та попередження травм опорно-рухового апарата.

Ортези Push Med характеризуються високим рівнем ефективності, комфорту та якості. Ортези на плечовий суглоб Push med Shoulder Brace Plus забезпечує належну фіксацію та полегшення больових відчуттів. Ортези на підтримка та стабільне підтримання положення плечових суглобів є основою його характеристик.

Продукція Push Med є інноваційною та вироблена для Вас із особливою ретельністю. Ми прагнемо надати максимальну впевненість задля задоволеності користувача.

Перед застосуванням ортеза уважно ознайомтеся з інструкцією.

Якщо Ви маєте будь-які питання, будь ласка, звертіться за консультацією до дистриб'ютора або надішліть електронний лист на адресу akom@akom.ua
ч ніпобудовуй адаптації.

Перевіряйте Ваш ортез Push щоразу перед використанням на наявність ознак зносу або розходження шва. Найвища ефективність бандажа Push може бути гарантована лише якщо виріб цілком непошкоджений.

У размках регламенту ЄС 2017/745 Про медичні вироби, користувач повинен повідомити виробника та компетентний орган держави-члена, в якій користувач проживає, про будь-який серйозний інцидент, пов'язаний з продуктом.

У випадку можливого подразнення шкіри дощільно носити ортез поверх одягу.

ВАЖЛИВО
- Правильне використання ортеза має визначити лікар.
- Бандажі Push бути розроблені для використання на непошкодженій шкірі. Пошкоджену шкіру спочатку потрібно покрити відповідним матеріалом.
- Оптимального функціонування можливо досягти за допомогою правильно підібраного розміру. Приміряйте бандаж перед покупкою, щоб перевірити його розмір. Професійний персонал вашого торговельного представника допоможе вам найкраще підібрати бандаж Push. Ми рекомендуємо зберігати цю інформацію про продукт в надійному місці, щоб мати можливість звернутися до неї за інструкціями за необхідності.
- Проконсультуйтеся з лікарем з бандажів, якщо продукт потребує індивідуальної адаптації.
- Перевіряйте Ваш ортез Push щоразу перед використанням на наявність ознак зносу або розходження шва. Найвища ефективність бандажа Push може бути гарантована лише якщо виріб цілком непошкоджений.
- У рамках регламенту ЄС 2017/745 Про медичні вироби, користувач повинен повідомити виробника та компетентний орган держави-члена, в якій користувач проживає, про будь-який серйозний інцидент, пов'язаний з продуктом.
- У випадку можливого подразнення шкіри дощільно носити ортез поверх одягу.

ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ
Ортез на плечовий суглоб Push med Shoulder Brace Plus складається з чотирьох компонентів. Грудний ремінець, який застібається навколо грудної клітки або шиї, є основою ортеза. Довжину цього ремінця можна регулювати лише відповідно для правильного розміру. Застібку з швидкою фіксацією (Ⓐ) можна використати для відтягування та закриття ремінця для грудної клітки та для максимального комфорту. Для максимального попередження відведення плечового суглоба, ремінець плеча фіксує плече до тіла. Комфортно опора зап'ясної руки фіксує руку і підтримує її. Ортез на плечовий суглоб Push med Shoulder Brace Plus дозволяє комфорту завдяки плечовому ремінцю, який додається до ортезу: цей ремінь забезпечує додаткову іммобілізацію та підтримку ураженого плечового суглоба та дозволяє тримати руку на потрібній висоті. Кожна точка фіксації є індивідуально регульованою, для оптимальної фіксації за будь-яких обставин.

Ортез виконаний зі зручного та високоякісного матеріалу Sympress™. Використовуване мікропористо дозволяє відчути м'якість уокерудині ортезу і зберегти шкіру сухою. Кромки ремінця також ж мягкі. Ортез на плечовий суглоб Push med Shoulder Brace Plus розроблений на регулярний гігієнічний догляд (прання).

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
- Переломи ключиці.
- Лікування після (під)вивиху;
- Лікування після (під)вивиху грудинно-ключенного або акроміально-ключичного суглоба;
- Лікування у післяопераційному періоді;
- Тендиніт ротаторної периартрит;
- Субакліальний перелом плеча;
- Як бандаж в випадку слабкого темпарезу (також вночі).

Інформація про такі порушення, коли ортез не можна або не варто носити, відсутня. У разі порушень цілісності кожи у кінцівках бандаж може викликати пліреміію. Уникайте надмірно тугого накладання ортеза на почвати використання.

Біль завжди є попереджувальним знаком. Якщо біль не зникає або сварти посилюється, звернутися за консультацією до Вашого лікаря або фахівця-ортопеда.

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ
Ортез випускається в 3 розмірах. Для правильного накладання важливість окружність грудної клітки на 5 сантиметрів вище рівня пікпьового суглоба у висячому положенні. У таблиці на упаковці вказано правильний розмір ортеза для окружності Вашої грудної клітки.

Правильна послідовність надягання визначається символами у зростаючій послідовності на застібці-липучці (Ⓒ Ⓓ Ⓐ).

Усі застібки-липучки, позначені символами, необхідно розкрити; інші залишаються закритими.

1. Візьміть ортез здоровою рукою за широку ділянку плечового ремінця.
2. Просуньте уражену руку і голову через отвір.
3. Застебніть плечовий ремінець, пропустивши ремінець через застібку і застебнувши його трохи вище ліктя (Ⓒ).

Для спеціалістів, який постачає ортез: Перед початковим використанням ремінця ортеза необхідно відрегулювати для пацієнта обидва рази.

4-1. *Слід відрегулювати плечовий ремінець зазду для забезпечення знаходження вуруднего ремінця на однаковій висоті з плечем*

4-2. *Потім необхідно відрегулювати вуруднеї ремінець. Ремінці нагнути, щоб він щільно прилягав до тіла, а пацієнт почував себе комфортно.*

4. Застебніть грудний ремінець, щоб було зручно (Ⓐ).
5. Покладіть свою руку на опору зап'ясної руки і застебніть її на плечовому ремінці (Ⓑ).
6. Ви можете перемішувати опору зап'ясної руки на грудному ремінці (вліво/вправо) або потягнути (вгору/ вниз), щоб досягти максимально комфортного розташування.

Інструкції для обрізкі ортезів для пацієнтів у положенні лежачи:

- вимірйте повному окружності пацієнта;
- помножте ці на 2;
- використовуйте застібку, щоб відрегулювати довжину грудного ремінця зазду;
- розстебніть грудний ремінець за допомогою швидкого розкриття;
- встановіть ортез.

ІНСТРУКЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

Для підтримання гігієни та забезпечення максимального строку експлуатації бандажу, важливо його регулярно прати, дотримуючись інструкцій по догляду.

Якщо ви маєте намір не використовувати бандаж протягом певного часу, рекомендується, щоб ви вивчили та висушили його перед зберіганням.

Перед праанням закрійте застібку-липучку, щоб захистити ортез та інші речі, що перуться разом із ним.

Можна використати цикл віджиму для делікатних речей: після цього ортез вивішують для висушування на відкритому повітрі (**подалі від** джерела нагрівання та не у сушарці).

Push® є зареєстрованою торговою маркою компанії «Неа Інтернешнел Біз» (Nea International bv)

Push® ist Nea International bv 的注册商标。

PUSH MED 肩部支撑护具加强版

简介
Push med产品为治疗和预防运动组织损伤提供了有效的解决方案。

Push med肩部支撑护具是一款全新的产品，具有高效、舒适和高品质的特点。Push med肩部支撑护具加强版可以提供更加出色的固定手腕解开绳。机械支撑和稳定的肩部定位均成了其性能的基础。

Push med产品具有创新性，专为您精心打造。我们致力于最大限度地增强您的信心，为用户的利益着想。在使用Push med肩部支撑护具加强版之前，请仔细阅读产品信息。如果您有任何疑问，请直接咨询您的供应商或访问 www.push.eu。

产品特点
您的Push med肩部支撑护具加强版由两个组件构成。围绕胸部或上腰部闭合的胸带构成了支撑护具的基础。胸带只需调整一次，以调整到最佳尺寸。"快速锁定"开关 (Ⓒ) 可用于打开和关闭胸带，并调整舒适度。为了尽可能地贴合您的身体，上臂带会将上臂固定在身体上，舒适的手腕/手部支撑可以使手臂保持固定并提供支撑。Push med肩部支撑护具加强版通过支撑护具上的肩带增加舒适性：此肩带可以为您提供支撑和稳定的固定和支撑，并允许将手保持在所需高度。每个调节点都可单独调节，以便在所有情况下都能达到最佳适配。该支撑护具由Sympress™（一种舒适的高品质材料）制成，使用的微纤维内部触感柔软，并保持干燥。肩带边缘的触感柔软。Push med肩部支撑护具加强版可正常清洗。

适应症
- 锁骨骨折
- （半脱位）脱臼后的治疗
- SC 或 AC 关节（半脱位）脱臼后的治疗
- 术后治疗
- 肱骨头周围关节炎
- 肱骨下段骨折
- 在轻偏瘫的情况下作为吊带（也可在夜间使用）

未发现不适合使用支撑护具的病症。在四肢血液循环不良的情况下，支撑护具可能导致充血。避免让支撑护具在一开始感到过紧。疼痛始终是警示信号。如果疼痛持续或症状恶化，建议咨询您的医生或治疗师。

穿戴/调节
肩部支撑护具共有3个尺寸选项。为了正确穿戴，胸围应该比悬垂肩部高出5厘米。为了帮助您选择合适的胸带的尺寸，请参阅产品信息。

正确的穿戴顺序由魔术粘上进增的 顺序符号决定 (Ⓒ Ⓓ Ⓐ)。

所有标有符号的魔术粘必须打开；其他紧固件则仍然保持闭合状态。

A. 用患侧手臂握住支撑护具的宽阔部分。
B. 患侧手臂和头部穿过开口。
C. 将上臂条穿过扣环并将其下封部上方闭合 (Ⓒ)。

对于进行支撑护具的专业人士：在初次使用之前，必须为患者调整支撑护具的两根条带：

D1. ***调整背部的带子，确保胸带与上臂的高度相同***

D2. ***然后调整胸带，使其紧贴身体，让患者感觉舒适。***

D. 闭合胸带。使其舒适贴合 (Ⓐ)。
E. 将手放在手腕/手部支撑护上，然后在前臂上闭合 (Ⓑ)。
F. 您可以在胸带上（左/右）滑动或（上/下）拉动手腕/手部支撑件，以达到最佳适配。

针对处于倾斜体位的患者的固定说明：
- 测量患者周长的一半
- 用圆量结果乘以 2
- 使用搭扣调整胸带在背部的长度
- 使用快速释放装置解开胸带
- 穿戴支撑护具

保养和维护
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

为了确保护具的洁净，以及最大化延长护具的使用寿命，按照以下清洗说明定期清洗护具非常重要。

如您打算将支撑护具闲置一段时间，建议在在放支撑护具之前清洗并干燥。清洗之前，请闭合魔术粘以保护支撑护具和其他衣物。

可以在最高 30°C 的条件下，按照洗涤精细织物的程序洗涤手工清洗支撑护具。请勿使用任何漂白剂。

可以使用温柔旋转的洗涤干燥程序：在此之后，将支撑护具悬挂在室外晾干（避免添加热源或放置于滚筒式烘干机中）。

重要说明
- 仅确使用 Push 支撑护具可能需要医生或治疗师的诊断意见。
- Push 支撑护具设计用于穿戴在未受损的皮肤上。如需在受损的皮肤上使用，必须先覆盖一层合适的材料。
- 只有选择合适的尺寸才能实现最佳功能。购买之前，请穿戴支撑护具以检查其舒适性。您的经销商的专业人员将说明穿戴 Push 支撑护具的最佳方法。我们建议您将本产品信息保存在安全的地方，以便在需要时查阅穿戴说明。
- 如果产品需要进行体重调整，请咨询支撑护具专家。
- 每次使用前检查您的 Push 支撑护具是否存在磨损或缝线的磨损或老化迹象。只有在产品完好无损的情况下，才能保证 Push 支撑护具的最佳性能。
- 在欧盟医疗器械法规 2017/745 的框架内，用户必须向制造商和用户所在的成员国的主管当局报告涉及产品的任何严重事故。
- 如果皮肤感到任何刺激，建议将护具穿戴在衣物之外。

Push® 是 Nea International bv 的注册商标。

BANDAGE D'ÉPAULE PUSH MED PLUS

INTRODUCTION
Les produits Push med offrent des solutions efficaces pour le traitement et la prévention de blessures de l'appareil locomoteur.

Votre nouveau bandage est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Le bandage Push med Plus assure une fixation correcte et soulage de la douleur. Son fonctionnement est basé sur le soutien mécanique et le positionnement stable à l'épaule.

Les produits Push med sont innovants et sont fabriqués pour vous avec le plus grand soin. Nous nous engageons à offrir une confiance maximale afin de satisfaire les utilisateurs. Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser le bandage Push med Plus. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou utiliser l'adresse www.push.eu (info@push.eu).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Votre bandage Push med Plus se compose de quatre éléments. La bande de torse qui se referme autour du bas du buste ou du haut de la taille, constitue la base du bandage. Cette bande doit seulement être ajustée une fois à la taille correcte. Le « verrouillage rapide » peut être utilisé (Ⓒ) pour ouvrir et fermer la bande de torse et pour l'ajuster afin d'optimiser le confort. Pour éviter autant que possible une abduction de l'épaule, la bande de bras lie le bras contre le corps. Le support de poignet/main confortable maintient le bras maintient et le soutient. La bande d'épaule ajoutée au bandage Push med Plus améliore encore le confort : cette bande assure une immobilisation et un soutien supplémentaires à l'articulation de l'épaule affectée et permet de maintenir la main à la hauteur souhaitée. Chaque point de fixation est individuellement réglable, pour un ajustement optimal en toutes circonstances. Le bandage est fabriqué en Sympress™, un matériau confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibres donne une sensation douce à l'intérieur et permet à la peau de rester sèche. Les bords des bandes sont également doux au toucher. Le bandage Push med Plus peut se laver normalement.

INDICATIONS
- Fracture de clavicule
- Traitement après (sub)luxation
- Traitement après (sub)luxation de l'articulation sterno-claviculaire ou acromio-claviculaire
- Traitement postchirurgical
- Périarthrite huméroscapulaire
- Fracture subcapitale de l'humérus
- Comme soutien en cas d'hémiparésie légère (également pendant la nuit)

Il n'existe aucun trouble connu intercisant ou rendant impossible le port du bandage. En cas de faible circulation sanguine dans les membres, un bandage peut provoquer une hyperémie. Evitez de serrer le bandage trop fort au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DÉTERMINATION DE LA TAILLE/AJUSTAGE
Le bandage est disponible en 3 tailles. Pour un ajustement précis, le tour de poitrine se mesure à peu près 5 centimètres au-dessus du coude du bras libre. Le tableau sur l'emballage vous indique la taille qui convient à votre tour de poitrine.

L'ordre d'ajustement correct est déterminé par les symboles de molécule croissants sur les fermetures à boucles et à crochets (Ⓒ Ⓓ Ⓐ).

Toutes les fermetures à boucles et à crochets portant des symboles doivent être ouvertes ; les autres restent fermées.

A. Saisissez le bandage avec le bras non affecté au niveau de la section large de celle-ci.
B. Passez le bras affecté et la tête à travers l'ouverture.
C. Fermez la bande de bras en la faisant passer à travers le fermoir et en la fermant juste au-dessus du coude (Ⓒ).

Pour les professionnels qure fournissent le bandage : avant la première utilisation, deux bandes du bandage ajustate pentru pacienta doit:

D1. Réglez la bande d'épaule à l'arrière pour vous assurer que la bande de torse est à la même hauteur que le bras

D2. Ajustez ensuite la bande de torse afin qu'elle s'ajuste parfaitement et de manière confortable au corps du patient.

D. Fermez la bande de torse afin qu'elle s'ajuste confortablement (Ⓐ).
E. Mettez la main dans le support de poignet/main et fermez-la sur la bande d'épaule (Ⓑ).
F. Vous pouvez faire glisser le support de poignet/main sur la bande de torse (gauche/droite) ou le tirer (haut/bas), pour obtenir le meilleur ajustement possible.

Instructions de fixation pour les patients en position allongée :

- Mesurez la moitié de la circonférence du patient
- Multipliez cette valeur par 2
- Utilisez le fermoir pour régler la longueur de la bande de torse à l'arrière
- Ouvrez la bande de torse à l'aide du système de libération rapide
- Ajustez le bandage

SOIN ET ENTRETIEN
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

Pour assurer l'hygiène et prolonger la durée de vie du bandage, il importe de le laver régulièrement en respectant les instructions de lavage.

Si le bandage n'est pas utilisé durant une période prolongée, il est conseillé de le laver et de le faire sécher avant de le ranger.

Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger le bandage d'épaule et le reste du linge.

Le bandage peut être lavé à des températures allant jusqu'à 30 °C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher le bandage à l'air libre (pas près de source de chaleur ni dans un sèche-linge).

IMPORTANT
- L'utilisation appropriée du bandage Push peut nécessiter le diagnostic d'un médecin ou d'un thérapeute.
- Les bandages Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille de bandage adéquate. Essayez le bandage avant de l'acheter. Un vendeur de la taille vous conseillera. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre bandage Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement du bandage à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des bandages si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Vérifiez votre bandage Push avant chaque utilisation, pour détecter tout signe d'usure ou de vieillissement des éléments ou des coutures. L'efficacité de votre bandage Push ne peut être garantie que si le produit est parfaitement intact.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale, utilizatorul trebuie să raportere producătorului și autorității competente din statul membru unde este reședința orice incident grav în legătură cu produsul respectiv.
- En cas d'irritation cutanée éventuelle, il est conseillé de porter le bandage au-dessus des vêtements.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

ORTEZĂ PENTRU UMĂR PUSH MED PLUS

INTRODUCERE
Produsele Push med oferă soluții eficiente pentru tratamentul și prevenirea leziunilor aparatului locomotor.

Noua dumneavoastră ortoză pentru umăr este un produs Push med, caracterizat prin un nivel crescut de eficacitate, confort și calitate. Ortoza pentru umăr Push med Plus asigură o fixare corespunzătoare și contribuie la ameliorarea durerii. Susținerea mecanică și poziționarea stabilă a umărului reprezintă baza performanțelor sale.

Produsele Push med sunt inovatoare și produse cu multă atenție pentru dumneavoastră. Ne angajăm să vă oferim încrederea maximă. În interesul utilizatorilor multipuși. Citiți cu atenție informațiile referitoare la produs înainte de a utiliza ortoza pentru umăr Push med Plus. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să întrebați furnizorul nostru sau să accesați www.push.eu (info@push.eu).

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Ortoza dumneavoastră pentru umăr Push med Plus este formată din patru componente. Banda din zona toracelui, care se închide în jurul pieptului sau taliei superioare, constituie baza ortezei. Acesteă banda trebue ajustată o singură dată pentru dimensiunea corectă. „Blocarea rapidă" (Ⓒ) poate fi utilizată pentru a deschide și în timpul și ajustarea ortezei, în scopul unui confort optim. Pentru a limitea abducția de pe o parte a umărului, banda pentru brat fixează bratul de corp. Suportul confortabil pentru încheietură/mână menține bratul fixat și îl susține. Orteza pentru umăr Push med Plus creste confortul prin banda pentru umăr care a fost adăugată la ortezei: acesteă banda oferă o imobilizare suplimentară, susține articulația umărului afectat și permite menținerea mâinii la înălțimea dorită. Fiecare punct de fixare este reglabil individual, pentru o potrivire optimă în toate circumstanțele. Orteza este realizată din Sympress™, un material confortabil și de calitate. Utilizarea microfibrelor face ca interiorul să fie moale la atingere și să mențină pielea uscată. Marginile chingilor sunt de asemenea moi. Orteza pentru umăr Push med Plus poate fi spălată în mod normal.

INDICAȚII
- Fractura de clavicula
- Tratament după (sub)luxație
- Tratament după (sub)luxația articulației sternoclaviculare sau acromioclaviculare
- Tratament post-chirurgical
- Periartrită scapulohumerală
- Fractură subcapitală de humerus
- Ca bandaj în cazul unei hemiparezee ușoare (și noaptea)

Nu se cunosc afecțiuni în care orteza nu poate sau nu trebuie să fie purtată. În cazul unei circulații slabe a sângelui în membre, o ortază poate provoca hiperemie. Evitați aplicarea prea strânsă a ortezei la început.

Durerea este întotdeauna un avertisment. Dacă durerea persistă sau problema se agravează, se recomandă să vă adresați medicului sau terapeutului.

PROBARE / REGLARE
Orteza pentru umăr este disponibilă în 3 mărimi. Pentru o potrivire corectă, circumferința toracică este măsurată cu 5 centimetri peste nivelul cotului suspinut. Tabelul de pe ambalaj indică dimensiunea corectă a ortezei pentru circumferința dumneavoastră toracică.

Ordinea corectă de montare este determinată de simbolurile cresc&toare ale punctelor de pe sistemele de prindere cu arici (Ⓒ Ⓓ Ⓐ).

Toate sistemele de prindere cu arici marcate cu simboluri trebuie deschise; celelalte rămân închise.

A. Prindeți orteza cu brațul neafectat în zona largă a benzii de umăr.
B. Pasați brațul afectat și capul prin deschizătura.
C. Închideți banda pentru brat trecând banda prin clemă și închizând-o chiar deasupra cotului (Ⓒ).

Pentru profesioniștii care furnizează orteza: Înainte de utilizarea inițială, două benzi ale ortezei trebuie ajustate pentru pacientul dat:

D1. Reglați banda de umăr în spate pentru a vă asigura că banda din zona torace este aceeași înălțime ca brațul

D2. Apoi reglați banda din zona toracelui astfel încât să se potrivească bine pe corp și să fie confortabilă pentru pacient.

D. Închideți banda din zona toracelui astfel încât să se potrivească în mod confortabil (Ⓐ).
E. Apăsați-vă mâna în suportul pentru încheietură / mână și închideți-l pe banda de umăr (Ⓑ).
F. Puteți trece suportul pentru încheietură/mână pe banda din zona toracelui (stânga/dreapta), pentru a obține cea mai bună potrivire posibilă.

Instrucțiuni de fixare pentru pacienții aflați în poziția culcat:

- Măsurați jumătate din circumferința pacientului
- Înmulțiți-o cu 2
- Folosiți clemele pentru a regla lungimea benzii din zona toracelui în spate
- Deschideți banda din spate cu ajutorul dispozitivului de eliberare rapidă
- Reglați orteza

ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

Pentru a promova igiena și a maximiza durata de viață a ortezei, este important să spălați orteza regulat, respectând instrucțiunile de spălare.

Dacă intenționați să nu utilizați orteza pentru o perioadă de timp, se recomandă să o spălați și să o uscați înainte de depozitare.

Înainte de spălare, închideți sistemele de prindere cu arici pentru a proteja orteza și celelalte rufe.

Orteza poate fi spălată la temperaturi de pana la 30°C, cu un program pentru țesături delicate sau de mână. Nu utilizați înălbitori.

Se poate folosi un ciclu ușor de centrifugare: după aceasta, atârnați orteza pentru a se usca în aer liber (nu în apropierea unei surse de căldură sau într-un uscător de rufe).

IMPORTANT
- Utilizarea corectă a ortezei Push poate necesita diagnosticarea de către un medic sau un terapeut.
- „Push" țvarai skirti dėti ant nepažeistos odos. Jei oda pažeista, ją pirmiausia reikia uždengti tinkama medžiaga.
- Savo funkcija žvarai gali atlikti tik pasirinkus tinkamą jo dydį. Prieš įsigydami, žvarą užsimokėkite ant savęs, kad galėtumėte dėvėti. Profesionalus parduotuvės darbuotojas, kaip geriausia užsidėti „Push" žvarą. Rekomenduojame šią informaciją apie gamintį laikyti saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte peržiūrėti žvaro uždėjimo nurodymus.
- Jei gamintį reikia pritaikyti individualiai, pasitarkite su žvarų specialistu.
- Prieš naudodamasi patikrinkite, ar „Push" žvaras nėra nusidėvėjęs, ar jo dalys ir siūlės nėra nudilusios. Optimalaus žvarų „Push" žvarai gali atlikti tik tuo atveju, jei neturi trūkumų.
- Pagal ES reglamento 2017/745 dėl medicinos prietaisų reikalavimus apie visus su gamintiu susijusius rimtus incidentus naudotojas privalo pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje gyvena, kompetentingai institucijai.
- Jei oda sudirgsta, žvarą rekomenduojama dėvėti ant drabužių.

„Push®" yra registruotasis „Nea International bv" prekės ženklas

„PUSH MED" PETIES ĮTVARAS „PLUS"

ĮVADAS
„Push med" gaminiai yra puikus lokomotorinės sistemos sužalojimų gydymo ir profilaktikos sprendimas.

Naujasis jūsų peties įtvaras yra „Push med" gaminys, pasižymintis didesniu veiksmingumu, patogumu ir kokybe. „Push" med" peties įtvaras „Plus" tinkamai įtvirtina ir padeda mažinti skausmą. Jis yra efektyvus, nes suteikia mechaninės atramą ir stabilią išlaiko petį.

„Push med" gaminiai yra kruopščiai ir pagaminti iš kruopščiai kai naudotojai bučo patenkinti, siekiame įsipareigoję užtikrinti dėmesingumą jums. Jame naudodami „Push med" peties įtvara „Plus", atidžiai perskaitykite informacją apie gaminį. Jei kilų klausimų, nedvejodami kreipkitės į vietinį tiekėją arba apsilankykite adresu www.push.eu (info@push.eu).

GAMINIO SAVYBĖS
„Push med" peties įtvaras („Plus" sudaro keturi komponentai. Krūtinės juosta segama aplink krūtinę arba virš krūtinės juosmens dalį. Ši juosta yra įtvaro pagrindas. Ją reikia reguliuoti tik kartą, nustatant tinkamą dydį. Krūtinės juosta atlaisvinti arba uždegti ir sureguliuoti, kad būtų patogu, galima naudojant sparčiąsą jungtį (Ⓒ). Siekiant kiek įmanoma labiau išvengti peties abdukcijos, virštūrinės rankos dalies juosta užtikisuja virštūrinę rankos dalį prie kūno. Ranką įtvirtina ir pritaiko patogi rieto ar rankos atrama. „Push med" peties įtvaras „Plus" yra papildomas bandažas ant dabartinės ortezės: ši juosta papildomai imobilizuoja ir palaiko peties sąnarį, o ranką leidžia išlaikyti norimame aukštyje. Kiekviena įtvirtinimo taška galima reguliuoti atskirai ir optimaliai pritaikyti bet kokiomis aplinkybėmis. Įtvaras pagamintas iš „Sympress™" – patogios aukštos kokybės medžiagos. Dėl naudojamo mikropluošto vidus yra minkštas ir neleidžia odai prakaituoti. Juostos kraštai taip pat minkšti. „Push med" peties įtvarą galima skaitbti įprastai.

INDIKACIJOS
- Raktikaulio lūžis
- Gijimas po (už)lūžiuosčios
- Gijimas po SC arba AC sąnario (už)lūžiuosčios
- Gydymas po operacijos
- Peties ir nentės periartritas
- Subkapitalinis žastikaulio lūžis
- Kaip dirbas, esant nedideliei hemiparezei (taip pat naktį)

Žinomų ligų, kuriomis segant įtvarą reikėtų galima arba nebūtų rekomendoja naudoti, nėra. Sutrikus galiūnų kraujotakai, įtvaras gali sukelti hiperemiją. Įtvaro iš pradžių per stipriai neužveržkite.

Skausmas visada signalizuoja pavoju. Jei skausmas nepraeina arba simptomai stiprėja, rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba terapeutu.

UŽDĖJIMAS IR SUREGULIAVIMAS
Peties įtvarą galima rinkti iš 3 dydžių. Kad tiktų, krūtinės apimtį reikia matuoti 5 cm virš akšinės. Ant pakuotės esančioje lentelėje nurodomas tinkamas įtvaro dydis pagal krūtinės apimtį.

Tinkamą uždėjimo seką rodo ant lipukų ir kilpų esantys didėjantys molekulės simboliai (Ⓒ Ⓓ Ⓐ).

Visus lipukus, pažymėtus nurodytais simboliais, reikia atverti; kiti gali likti suspausti.

A. Sveikąja ranka suimkite įtvarą ties plačiąja peties juostos dalimi.
B. Užsidėkite žeidžiamo roku un galvu ciaur atvėrumu.
C. Kūrtinės rankos dalies juosta nutiesikite pro sagtį ir užsikėsite tiesiai virš elkoną (Ⓒ).

Specialistai, kurie įtvarą parduoda: prieš naudojant pirmą kartą, dvi įtvaro juostas reikia sureguliuoti pagal pacientam:

D1. Sureguliuokite nugarinę esančią peties juostą, kad krūtinės juosta būtų tokiame pačiame aukštyje kaip virštūrinė rankos dalis.

D2. Po to krūtinės juosta reikia sureguliuoti taip, kad būtų arti kūno ir pacientas jaustųsi patogiai.

D. Krūtinės juosta priskelte taip, kad būtų patogu (Ⓐ).
E. Ranką įdėkite į rieto (rankos) atramą ir priskelte peties juostą (Ⓑ).
F. Rieto (rankos) atramą galite paslinkti ant krūtinės juostos į kairę arba dešinę, kad būtų patogu.

Tvirtinimo nurodymai pacientui sėdint:

- Išmatuokite pusę paciento apimties.
- Padauginkite iš 2.
- Krūtinės juostos ilgį nugarinėje sureguliuokite naudodami sagtį.
- Spartiąją jungtimi atlaisvinkite krūtinės juostą.
- Uždėkite įtvarą.

PRIEŽIŪRA
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

Siekiant palaikyti higieną ir maksimiaiai padidinti įtvaro tarnavimo laiką, svarbu reguliariai plauti įtvarą, laikantis skalbimo instrukcijų.

Jei ketinate kurį laiką nenaudoti įtvaro, rekomenduojama prieš laikant jį nuplauti ir nusausinti.

Prieš skalbdami, įtvarą ir kitus skalbinius apsaugokite užspausdami lipukus.

Įtvarą galima skalbti iki 30 °C temperatūros vandenyje skalbyklėje, nustačius jautrių audinių programą, arba rankomis. Nenaudokite jokių balinimo priemonių.

Galima jungti švelnią gręžimo programą. Po to įtvarą padžiaukite, kad išdžiūtų ašvirame ore (ne greta šildymo šaltinio ar elektrinės džovyklės).

SVARBU
- Norint „Push" įtvarą naudoti tinkamai, gali reikėti, kad gydytojas arba terapeutas nustatytų diagnozę.
- „Push" žvarai skirti dėti ant nepažeistos odos. Jei oda pažeista, ją pirmiausia reikia uždengti tinkama medžiaga.
- Savo funkciją žvarai gali atlikti tik pasirinkus tinkamą jo dydį. Prieš įsigydami, žvarą užsimokėkite ant savęs, kad galėtumėte dėvėti. Profesionalus parduotuvės darbuotojas, kaip geriausia užsidėti „Push" žvarą. Rekomenduojame šią informaciją apie gamintį laikyti saugioje vietoje, kad prireikus galėtumėte peržiūrėti žvaro uždėjimo nurodymus.
- Jei gamintį reikia pritaikyti individualiai, pasitarkite su žvarų specialistu.
- Prieš naudodamasi patikrinkite, ar „Push" žvaras nėra nusidėvėjęs, ar jo dalys ir siūlės nėra nudilusios. Optimalaus žvarų „Push" žvarai gali atlikti tik tuo atveju, jei neturi trūkumų.
- Pagal ES reglamento 2017/745 dėl medicinos prietaisų reikalavimus apie visus su gamintiu susijusius rimtus incidentus naudotojas privalo pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje gyvena, kompetentingai institucijai.
- Jei oda sudirgsta, žvarą rekomenduojama dėvėti ant drabužių.

„Push®" yra registruotasis „Nea International bv" prekės ženklas

PUSH MED PLECA ORTOZE PLUS

IEVADS
Push med izstrādājumi nodrošina efektīvas risinājumus balsta un kustību orgānu sistēmas traumu ārstēšanai un novēršanai.

Jūsu jaunā pleca ortoze ir Push med sērijas izstrādājums ar augstu efektivitātes, komforta un kvalitātes līmeni. Push med pleca ortoze Plus ierobežo sāpēšanas un palīdz samazināt sāpes. Tās iedarbības pamatā ir mehāniskais atbalsts un stabila pleca pozicijas nofiksēšana.

Push med izstrādājumi ir inovatīvi un izstrādāti ļoti rūpīgi. Mēs vēlamies jums sniegt maksimālu pārliecību, lai gādātu par klientu apmierinātību. Pirms Push med pleca ortozes Plus izmantošanas rūpīgi izlasiet informāciju par produktu. Ja jums radušies kādi jautājumi, droši sazinieties ar savu piegādātāju vai izmantojiet tīmekļa vietni www.push.eu (info@push.eu).

IZSTRĀDĀJUMA RAKSTURĪGĀS IPAŠĪBAS
Push med pleca ortozi Plus veido četri komponenti. Krūšu saite, kas aptver krūšu daļu vai augšējo vēderu daļu, veido ortozes pamatni. Šo saiti nepieciešams pielāgot tikai vienu reizi, lai nodrošinātu pareizo izmēru. "Ātro fikseratoru" (Ⓒ) var izmantot, lai atbrīvotu un nofiksētu krūšu saiti, kā arī to pielāgotu maksimālu komfortu pandēšanai. Lai pēc iespējas efektīvāk novērstu pleca abdukciju, augšdelma saite nofiksē augšdelmu pie ķermeņa. Komfortabla plaukstas locītavas/roskas balsts saglabā roku fiksētā pozīcijā un sniedz tai atbalstu. Push med pleca ortoze Plus palielina komfortu līmeni ar pleca saiti, kas ir pievienota ortozei: šī saite nodrošina papildu imobilizāciju un atbalstu ietekmējošai pleca locītavai, kā arī ļauj roku turēt nepieciešamajā augstumā. Katru fiksācijas punktu ir iespējams individuāli pielāgot, lai nodrošinātu optimālu pieejamību ikvienā gadījumā. Ortoze ir izgatavota no komfortabla un augstā kvalitātē materiāla Sympress™. Tajā izmantotā mikrošķiedras rada mīkstu ādas sajūtu. Mīkstas ir arī saišu malas. Push med pleca ortozes Plus nav īpašu mazgāšanas prasību.

ENDIKASYONLAR
- Köprücük kemiği kırılması
- Subluksasyon sonrası tedavi
- SC veya AC ekleminin subluksasyonu sonrası tedavi
- Ameliyat sonrası tedavi
- Humeroskapular periartrit
- Subkapital kol kemiği kırılması
- Zayıf hemiparezi durumunda bir askı olarak (gece de)

Desteğin takılamamasını veya takılmamasını gerektirecek bilinen bir rahatsızlık yoktur. Ekstremitelerde zayıf kan dolaşımı varsa bir destek hiperemiye neden olabilir. En baştа desteği çok sıkı uygulamamaya çalışın.

Ağrı her zaman bir uyarı işaretidir. Ağrı devam edense veya şikayet kötüleşirse doktorunuza veya terapistinize başvurmanız önerilir.

TAKMA / AYARLAMA
Ortoz desteğinin 3 boyutu vardır. Düzgün takmak için asılı direoğin düzeyinin 5 santimetre üstünden göğüs çevresi ölçülür. Ambalajdaki tabloda göğsünüzün çevresi esas alınarak doğru destek boyutunu belirtir.

Doğru takma sırası kancadaki ve halka sabitleyicilerdeki molekül sembolleri artmalarak belirlenir (Ⓒ Ⓓ Ⓐ).

Sembollerle işaretli tüm kanca ve halka sab